


WEST NILE DISEASE

Che cosa è?

La WEST NILE DISEASE (WDN) è causata da un virus che alberga negli uccelli selvatici e che può essere trasmesso solo attraverso la puntura di zanzara a mammiferi, uccelli e rettili. In rari casi l'uomo può contrarre il virus, ma non può contagiare altre persone.



SINTOMI

periodo di incubazione di 2-14 giorni

80%
NESSUN
SINTOMO




20%
SINTOMI
SIMIL –
INFLUENZALI



FEBBRE



MAL DI TESTA



NAUSEA/VOMITO



SFOGHI CUTANEI


-1%
SINTOMI
NEUROLOGICI



ENCEFALITE
MENINGOENCEFALITE
PARALISI FLACCIDA
(soprattutto nei soggetti
anziani e "fragili")

PREVENZIONE

Consigli utili per ridurre le punture e bloccare la proliferazione di zanzare



COPRIRE CISTERNE, PISCINE,
CONTENITORI D'ACQUA PIOVANA
CON COPERCHI ERMETICI, TELI O
ZANZARIERE



RIMUOVERE FONTI DI ACQUA
STAGNANTE. CAMBIARE SPESSO
L'ACQUA DALLE CIOTOLE PER
ANIMALI.



ELIMINARE POSSIBILI RIPARI
DOVE POSSONO ANNIDARSI
VOLATILI INFETTI E VERIFICARE
CHE LE GRONDAIE SIANO PULITE
E NON OSTRUITE.



ALL'APERTO, SOPRATTUTTO
NELLE ORE NOTTURNE,
UTILIZZARE REPELLENTI CONTRO
GLI INSETTI.



SCHERMARE PORTE E FINESTRE
CON ZANZARIERE.

Se hai uno dei sintomi rivolgiti al tuo medico o pediatra

CONTATTI

✉ malattie.infettive@aspct.it

☎ 095 2540104



ASP
CATANIA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC SANITÀ PUBBLICA, EPIDEMIOLOGIA
E MEDICINA PREVENTIVA